

Trois espèces de Coléoptères nouveaux, par M. GORY.

(Séance du 5 septembre 1832.)

Buprestis Lepida. Gory. Senegal. Du cabinet de M. Gory.

Corpore supra elongato, capite viridi-rubro-maculato, thorace trapeziformi, viridi utrinque rubro-igneo-micante, elytris viridibus, singulis vittâ longitrorsum latâ et flavâ, lævigatâ, nigro-marginatâ, subtus viridi-aurato, tomentoso, pedibus viridibus, tarsis æruleis.

Long. 9 à 12 lig. Larg. 3 à 4.

Ce Bupreste est un des plus jolis que nous ayons vus, de forme allongée et peu convexe; tête de la largeur du corselet, d'un vert brillant, avec le milieu d'un rouge métallique et ponctué; yeux couleur marron, assez saillans. Antennes deux fois plus longues que la tête, vertes à leur base et brunes dans le reste de leur longueur. Corselet de forme trapézoïde, presque aussi long que large, un peu élargi postérieurement et presque plane en dessus; le reste d'un beau vert luisant, bleuâtre et lisse, avec une forte impression longitudinale dans son milieu, qui est bleuâtre et lisse; les côtés sont rugueux et ont chacun une tache d'un rouge de feu très-brillant; son bord postérieur est sinué et prolongé au milieu dans une échancrure des élytres; celles-ci ont leur base un peu plus large que le corselet; elles sont deux fois et demi plus longues que larges, diminuent au tiers de leur longueur, et se terminent en pointe simple; elles sont d'un beau vert, très-brillant, sillonnées et ponctuées dans leurs parties vertes, et ont chaque une bande longitudinale jaune, très-large, lisse et entourée de bleu noirâtre: cette bande n'atteint ni la base ni l'extrémité.

Dessous du corps vert doré, avec un duvet très-serré, lui-

sant et blanc , qui lui donne des reflets argentés. Pattes vertes ; avec les tarses bleus.

La femelle est de la même couleur , mais généralement un peu plus grande.

Ce bel insecte se trouve au Sénégal , et m'a été envoyé par M. Bax.

M. le comte Dejean lui avait donné le nom de Dives ; mais , ce nom ayant été déjà assigné par Germar à un Bupreste de Saint-Domingue , j'ai dû le changer.

Allocerus Dilaticornis. Gory. Cayenne. Du cabinet de M. Gory.

Niger, thorace lineolis tribus elevatis ; antennarum basi testacea.

Long. 15 lig. Larg. 16 lig.

Tête petite , avec un large enfoncement entre les yeux.

Antennes en forme de fuseau. Premier article assez long , renflé ; le deuxième très-petit , arrondi ; tous les autres très-dilatés , s'amincissant à l'extrémité.

Corselet bombé , carré , beaucoup plus large que la tête , très-échancré au milieu de ses bords latéraux , sa base prolongée et un peu échancrée vis-à-vis de l'écusson , avec trois lignes longitudinales élevées sur son milieu.

Écusson triangulaire , arrondi , avec un enfoncement longitudinal dans son milieu , ce qui le fait paraître creusé.

Élytres allongées , bombées , parallèles , rétrécies et arrondies à l'extrémité ; sur chaque une côte longitudinale près de la suture.

Noir velouté.

Lèvre supérieure , dessous de la tête , premier article des antennes , bords latéraux du corselet , point sur l'écusson , jaune testacé.

Ce bel insecte m'a été envoyé de Cayenne.

Elater Madagascariensis. Gory. Madagascar. Du cabinet de
M. Gory.

*Niger, totusque albo flavescente villosus, antennis serratis, thorace
una recta, duabusque arcuatis albis lineis. Elytris striatis.*

Long. 16 lig. Larg. 6. lig.

Antennes avec le premier article long, arrondi; le deuxième globuleux; tous les autres en scie.

Tête petite, avec un enfoncement entre les yeux, ce qui la fait paraître creusée.

Corselet avec un sillon en dessous pour recevoir les antennes, plus long que large, arrondi antérieurement, s'élargissant, et ayant ses angles postérieurs saillans et prolongés sur les élytres; très-échancré postérieurement, et le milieu de sa base prolongé au devant de l'écusson.

Élytres très-bombées, peu allongées, rétrécies et arrondies à leur extrémité; elles ont un tubercule à la base de chaque côté de l'écusson.

Entièrement noir, mais tout couvert d'un duvet jaunâtre, court et très-serré, qui laisse peu apercevoir la couleur du fond, surtout sur les élytres et le dessous du corps.

Sur le corselet trois lignes jaunâtres: une longitudinale dans son milieu, qui n'atteint ni son bord antérieur ni sa base, et de chaque côté de celle-là une autre en forme d'arc; de plus, tout son disque noir velouté.

Le dernier segment de l'abdomen est garni à son extrémité d'une touffe de poils noirs, courts et rudes.

Ce bel insecte se trouve à Madagascar.
